

Registraties medicatie toediening polikliniek dermatologie

Een van de pijnpunten in de dagelijkse praktijk zijn de registraties, met als belangrijkste exponenten de 'medicatietoedieningsregistratie' en het protocol 'voor toediening gereed maken' (VTGM). Beide registraties zijn te algemeen geformuleerd (parenteraal) waardoor deze verplicht zijn op de dermatologische polikliniek. Dit levert een onevenredige administratieve last op, zonder dat men het gevoel heeft dat men een relevant probleem oplost. Het betreft hier twee aan elkaar gerelateerde processen:

1. In veel ziekenhuizen wordt gestreefd naar een medicatietoedieningsregistratie (MTR) volgens het 'closed loop' principe van alle klinisch en poliklinisch toe te dienen medicatie. Hierbij wordt het toe te dienen geneesmiddel (bij voorkeur met behulp van een barcode) gecontroleerd met de actuele medicatieopdrachten in het EPD. De medicatieopdracht betreft veelal een digitaal recept dat wordt geregistreerd naast de gebruikelijke verslaglegging in het dossier.

2. Een geneesmiddel voor parenterale toediening moet vaak nog een bewerking ondergaan voordat het aan de patiënt kan worden toegediend. Eenvoudige bewerkingen vinden veelal plaats op een verpleegafdeling of polikliniek. Deze bewerking wordt 'voor toediening gereed maken' (VTGM) genoemd. Het proces VTGM is een uitgebreid proces met verschillende stappen voor de verpleegkundige en begint met aanwezigheid van een door een arts geaccordeerde, schriftelijke medicatieopdracht. Deze opdracht kan ook elektronisch worden aangeboden (zoals onder 1. beschreven).

Besluit: De NVDV acht het registreren van *poliklinisch* toe te dienen medicatie (MTR), anders dan door middel van de gebruikelijke verslaglegging in het dossier, én het 'voor toediening gereed maken' (VTGM) NIET noodzakelijk voor de volgende middelen:

Topicale middelen, waaronder:

- indifferente middelen
- teerpreparaten
- corticosteroiden
- calcineurineremmers
- ditranol
- lidocaïne/prilocaïne
- podofylline
- trichloorazijnzuur
- fenol
- allergenen (ten behoeve van plakproeven)

Middelen voor lokale behandeling, niet topicaal toegediend, waaronder:

- triamcinolonacetonide intralesionaal
- verdovingsvloeistoffen s.c. of intracutaan

- sclerosantia i.v.

Orale systemische medicatie, waaronder:

- paracetamol
- NSAID's
- antihistaminica
- antibiotica

Parenteralia voor subcutane, intramusculaire of sublinguale toediening, waaronder:

- methotrexaat s.c. of i.m.
- biologics s.c.
- noodmedicatie i.m. of s.l. (eventueel na toediening te documenteren)

Besluit: De NVDV acht een schriftelijke of digitale medicatieopdracht ten behoeve van het 'voor toediening gereed maken' (VTGM) in de poliklinische setting enkel noodzakelijk voor parenteralia met een beoogd systemisch effect die *daadwerkelijk* voor toediening gereed moeten worden gemaakt, anders dan het alleen optrekken van de vloeistof, waaronder:

Parenteralia die bereiding (anders dan alleen het optrekken ervan) vereisen, waaronder:

- biologics i.v.
- antibiotica i.m. of i.v.
- noodmedicatie i.v. (eventueel na toediening te documenteren)