

DERMATOLOGIE IN BEELD

Topicale bèta-blokker als behandeling van granuloma teleangiectaticum

W.M.D. Blokhuis¹, R.I.F. van der Waal²

- ¹ Huisarts, Huisartsen Hoflaan, Kortenhoef
² Dermatoloog, afdeling Dermatologie, Tergooi, Hilversum/Blaricum

Correspondentieadres:
 Dr. R.I.F. van der Waal
 E-mail: RvanderWaal@Tergooi.nl

Een 89-jarige vrouw meldde zich bij de huisarts met een huidafwijking op de dorsale zijde van de linkerpols. Deze huidafwijking was zeven weken daarvoor nieuw en snel ontstaan na een val van de fiets en werd ondanks gebruik van hydrocolloïd wondzorgmateriaal niet kleiner. Bij onderzoek werd een granuloma teleangiectaticum gezien, posttraumatisch ontstaan (figuur 1).

De huisarts vroeg via teledermatologie behandeladvies aan de dermatoloog. Deze adviseerde aan de hand van de bestaande ervaringen met niet-selectieve β -adrenerge antagonisten bij hemangiomen om bij patiënte topicale behandeling te overwegen met timolol β -blokker oogdruppels. Deze conservatieve behandeling werd geadviseerd om hiermee te proberen excisie voor patiënte te besparen.

Na bespreking met patiënte van bovenstaande als off-labeltherapie is de huisarts behandeling gestart met applicatie van timolol oogdruppels (2,5 mg/ml, 2dd 1 gtt) op de huidafwijking. Deze behandeling bleek effectief: na een week was de huidafwijking fors geslonken en reeds na veertien dagen bleek de huidafwijking te zijn verdwenen (figuur 2).



Figuur 1. Granuloma teleangiectaticum.



Figuur 2. Genezing na veertien dagen timolol ooggtt.