



Purpura annularis teleangiectodes van Majocchi

W. Touwslager¹, C. Wetzels², T. Brinkhuizen³

Op onze polikliniek presenteerde zich een 28-jarige vrouw met een sinds zes maanden bestaande rode huiduitslag die zonder evidente aanleiding was ontstaan. Haar klachten waren alleen van cosmetische aard. De door de huisarts gestarte behandeling met triamcinolonacetonide 0,1% crème gaf volledige genezing van de afwijkingen, maar er bleven nieuwe plekken bij komen.

Wij zagen op de romp, nates en bovenbenen meerdere lenticulair tot nummulair grote, vrij scherp begrensde annulaire, niet-wegdrukbaar, licht erythemateuze tot bruine maculae met petechiën. Deels werd ook centrale opheldering gezien (figuur 1).

Ter bevestiging van onze klinische diagnose van een gepigmenteerde purpurische dermatose (PPD) werd een biopsie afgenomen. In het preparaat werd in de oppervlakkige dermis veel extravasatie van erythrocyten gezien, met ook erythrocyten in de epidermis. Er was een matig perivascular, niet-atypisch lymfocytair ontstekingsinfiltraat waarbij lymfocyten tevens overgrijpen op basale keratinocyten met plaatselijk vacuolaire degeneratie (figuur 2).

Dit bevestigde onze klinische diagnose van een gepigmenteerde purpurische dermatose, waarbij het klinisch beeld het best past bij een purpura annularis teleangiectodes van Majocchi.

BESPREKING


Purpura annularis teleangiectodes van Majocchi is een vrij zeldzame variant van PPD die vooral wordt gezien bij vrouwelijke adolescenten. De annulaire afwijkingen van 1-3 cm groot worden meestal op de romp en onderste extremiteiten gezien. Behandeling met corticosteroïden is vaak effectief, bij uitgebreide afwijkingen kan lichttherapie met UVB TLo1 worden overwogen. Wij behandelde de patiënte met triamcinolonacetonide 0,1% crème 1dd in puls waarbij na zes weken goede verbetering werd gezien.

DIAGNOSE

Purpura annularis teleangiectodes van Majocchi.



Figuur 1. Annulaire niet-wegdrukbaar licht erythemateuze tot bruine maculae met petechiën op de nates en onderrug.



Figuur 2. Uitgesproken extravasatie van erythrocyten is zichtbaar bij de pijlen.

CORRESPONDENTIEADRES

Wouter Touwslager

E-mail: wouter.touwslager@mumc.nl

¹ Aios dermatologie, MUMC+, Maastricht en Catharina Ziekenhuis, Eindhoven

² Patholoog, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven

³ Dermatoloog, afdeling Dermatologie, MUMC+, Maastricht en Catharina Ziekenhuis, Eindhoven